

# AMOXICOLL 40% PX

No. DE REGISTRO: Q-7701-163

*Premezcla medicada*



AMOXICOLL 40% PMX  
*Premezcla medicada*

## **Fórmula:**

Cada 1,000 g contienen:

Amoxicilina.....400 g  
Excipiente c.b.p.....1,000 g

reproductoras y de Postura).

## **Mecanismo de acción:**

**Grupo farmacológico:** Betalactámico, aminopenicilina semisintética.

La amoxicilina inhibe las enzimas transpeptidasa lo que bloquea la síntesis del peptidoglucano que constituye la pared bacteriana durante la multiplicación activa lo que resulta en la formación de esferoblastos y al final lisis de la pared celular.

## **Tiempo de retiro:**

**Carne:** 48 horas.

**Huevo:** 9 días.

## **Contraindicaciones y restricciones:**

No administre a pacientes con antecedentes de hipersensibilidad al grupo de las penicilinas, oliguria o anuria o con antecedentes de hipersensibilidad a la amoxicilina o miembros de la familia de las penicilinas.

No administre a otra especie diferente de las indicadas en la etiqueta.

No administre de forma simultánea con tetraciclinas y/o sulfonamidas ya que pueden generar antagonismo.

No existen efectos adversos conocidos de su uso durante la lactancia o gestación, su uso en estas etapas debe hacerse previo análisis

## **Indicaciones de uso:**

Betalactámico con amplio espectro para el tratamiento de infecciones sistémicas, urinarias, gastrointestinales y respiratorias comunes en porcinos y aves como meningitis bacteriana, colibacilosis, Salmonelosis, coriza infecciosa, MMA, nefritis, cistitis, dermatitis, enteritis necrótica, cólera aviar y control de bacterias asociadas a complejo respiratorio porcino.

## **Dosis y vías de administración:**

Oral, mezclado con el alimento.

10 a 20 mg de amoxicilina/kg de peso, de 3 a 5 días continuos, equivalentes a: aves: pollos: 250 a 500 g/t; gallinas: 350 a 700 g/t; porcinos; engorda: 750 g a 1.5 kg/t; reproductoras: 1 a 2 kg/t.

## **Especies:**

Porcinos (Lechones, Engorda y Reproductoras) y aves (Pollos de engorda, Gallinas



de costo/beneficio.

Las penicilinas presentan baja toxicidad, sus efectos adversos incluyen reacciones moderadas de hipersensibilidad como: urticaria, fiebre y edema angioneurótico; anafilaxis aguda y colapso.

No existe tratamiento específico contra los signos de toxicidad o efectos adversos, el tratamiento va desde suspender el tratamiento y atender los signos presentados.

### Almacenamiento:

Conservar este producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.

Mantener este producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

**Presentaciones:** 25 kg.



CONSULTE AL MÉDICO  
VETERINARIO