

AMOXICOLL RT

No. DE REGISTRO: Q-7701-080

Suspensión inyectable.

Fórmula:

Cada 1 ml contienen:

Amoxicilina.....150 mg

Vehículo c.b.p.1 ml

Indicaciones de uso:

Betalactámico de larga acción en el tratamiento de infecciones sistémicas en tejidos blandos, piel, glándula mamaria, enfermedades respiratorias y gastrointestinales, tratamiento de mastitis, abscesos y lesiones infectadas, así como tratamiento post operatorio.

Dosis y vías de administración:

Intramuscular profunda.

1 ml/10 kg de peso corporal (Equivalente a 15 mg de amoxicilina por kg de peso corporal), cada 48 horas, dos aplicaciones.

Especies:

Bovinos (productores de carne, productores de leche), ovinos, porcinos (lechones, engorda y reproductoras) y caninos domésticos.

Mecanismo de acción:

Grupo farmacológico: Betalactámico, aminopenicilina semisintética.

AMOXICOLL RT
Suspensión inyectable.



La amoxicilina inhibe las enzimas transpeptidasa lo que bloquea la síntesis del peptidoglucano que constituye la pared bacteriana durante la multiplicación activa lo que resulta en la formación de esferoblastos y al final lisis de la pared celular.

Tiempo de retiro:

Carne: Bovinos y ovinos: 21 días; porcinos: 16 días.

Leche: 60 horas.

Contraindicaciones y restricciones:

No administre este producto a animales con hipersensibilidad.

No existe evidencia de efectos adversos de su uso durante la lactancia y gestación, Use este producto en hembras gestantes o lactantes previa evaluación del riesgo costo/beneficio.

No administre simultáneamente con gentamicina ya que se genera antagonismo. Puede inducir en contadas ocasiones reacciones alérgicas incluyendo anafilaxia, nefritis aguda, colitis pseudomembranosa con diarrea, superinfecciones y urticaria.

En caso de presentarse signos de toxicidad y efectos adversos, suspenda el tratamiento y trate los signos presentados.



Almacenamiento:

Conservar este producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
Mantener este producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Presentaciones: 100 y 250 mL.



CONSULTE AL MÉDICO
VETERINARIO