


ARSICOLL

No. DE REGISTRO: Q-7701-085

ARSICOLL

Solución inyectable

Solución inyectable



Fórmula:

Cada 1 mL contiene:

Acetato arsinito sódico.....50 mg

Vitamina B12.....2.5 µg

Vehículo c.b.p.1 mL

Indicaciones de uso:

Reconstituyente y estimulante del apetito con propiedades hematopoyéticas, está indicado como coadyuvante en el tratamiento de parasitosis, estados post infecciosos, estrés, desnutrición, inapetencia y anemias por causas múltiples.

Dosis y vías de administración:

Intramuscular y/o subcutánea.

Bovinos (carne y leche): 10 mL por animal (Equivalente a 500 mg de acetato de arsinito sódico por kg de peso corporal), cada 48 – 72 horas, no más de 5 aplicaciones.

Porcinos (lechones, engorda y reproductoras): de 5 mL (equivalente a 250 mg de acetato de arsinito sódico por kg de peso corporal), cada 48 – 72 horas, no más de 5 aplicaciones.

Especies:

Bovinos y porcinos.

Mecanismo de acción:

Grupo farmacológico: Reconstituyente estimulante del apetito.

Ejerce un efecto fortificante por su acción sobre el metabolismo corporal, desencadenando: un aumento en el anabolismo y una desasimilación retardada, lo que ocasiona un aumento en el consumo de alimento y un estado nutritivo equilibrado.

Tiempo de retiro:

No administrar este producto 5 días previos al sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

Contraindicaciones y restricciones:

No consumir la leche de bovinos tratados con este producto durante 5 días posteriores al tratamiento.

Pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad. Frente a una reacción anafiláctica se recomienda administrar parenteralmente epinefrina.

Detenga la administración del producto y reemplácelo por alimento fresco. Administre tratamiento sintomático.



Almacenamiento:

Conservar este producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
Mantener este producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Presentaciones: 100 y 250 mL.



CONSULTE AL MÉDICO
VETERINARIO