

COLLIVER ADE

No. DE REGISTRO: Q-7701-036

Solución inyectable

Fórmula:

Cada 1 mL contienen:

Ivermectina.....10 mg

Vitamina A.....200,000 UI

Vitamina D3.....30,000 UI

Vitamina E.....20 UI

Vehículo c.b.p.....1 mL

Indicaciones de uso:

Esta indicado para el tratamiento de parasitosis gastrointestinales y pulmonares por nemátodos y esta adicionado de vitaminas A, D y E que coadyuvan a la recuperación de la salud de bovinos, ovinos y porcinos.

Tiene acción contra los siguientes:

Endoparásitos: *Dictyocaulus viviparus*, *Metastrongylus* spp., *Ascaris suum*, *Bunostomum phlebotomum*, *Cooperia pectinata*, *C. punctata*, *C. oncophora*, *C. surnabada*, *Haemonchus placei*, *Hyostrongylus rubidus*, *Mecistocirrus digitatus*, *N. spathiger*, *Nematodirus helvetianus*, *Oesophagostomum* spp., *O. radiatum*, *Ostertagia lyrata*, *O. ostertagi*, *Strongyloides papillosus*, *Strongyloides ransomi*, *Trichuris suis*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Trichostrongylus axei*, *Toxocara vitulorum*, *Stephanurus dentatus*.

Ectoparásitos: *Psoroptes ovis* var. *bovis*,

COLLIVER ADE
Solución inyectable



Sarcoptes scabiei var. *ovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *suis*, *Chorioptes bovis*, *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum*, *Dermatobia hominis*, *Haematopinus suis*, *Linognathus vituli*, *Solenopotes capillatus*.

Dosis y vías de administración:

Subcutánea.

Bovinos y ovinos: una aplicación de 1 mL por cada 50 kg de peso corporal (equivalente a 200 µg de Ivermectina por kg de peso corporal).

Porcinos: una aplicación de 1 mL por cada 33 kg de peso corporal (equivalente a 300 µg de ivermectina por kg de peso corporal).

Especies:

Porcinos (lechones, engorda y reproductoras), bovinos (productores de carne y productores de leche), ovinos (productores de carne).

Mecanismo de acción:

Grupo farmacológico: Antiparasitario de amplio espectro.

Los fármacos endectocidas producen su efecto antiparasitario al incrementar la permeabilidad de la membrana celular para los iones cloro (Cl⁻), con la resultante hiperpolarización y parálisis de la musculatura faríngea y somática de los parásitos.



Tiempo de retiro:

No administrar este producto 28 días previos al sacrificio de los animales destinados al consumo humano

No consumir derivados animales durante los 28 días posteriores al último tratamiento.

Contraindicaciones y restricciones:

Para contrarrestar los efectos nocivos de las ivermectinas, se menciona que los siguientes fármacos y dosis pueden ser útiles, pero los efectos benéficos no son claros: imidacloprid, carbón activado, fisostigmina, picrotoxina, glicopirrolato, suspensiones estables de lípidos. Utilizar equipo de protección personal adecuado al administrar este tratamiento.

Almacenamiento:

Conservar este producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.

Mantener este producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Debido a la toxicidad que representa la ivermectina a los organismos acuáticos, los envases y sus residuos deberán desecharse en forma segura incinerándolos y/o enterrándolos.

Presentaciones: 100 y 500 mL.



**CONSULTE AL MÉDICO
VETERINARIO**