

COLLIVER-F

No. DE REGISTRO: Q-7701-035

COLLIVER-F

Solución inyectable

Solución inyectable



Fórmula:

Cada 100 ml contienen:

Ivermectina.....1 g

Clorsulón.....10 g

Vehículo c.b.p.....100 mL

Dosis y vías de administración:

subcutánea exclusivamente.

Una aplicación de 1 ml/50 kg de peso corporal (equivalente a 200 μ g de ivermectina y 2 mg de clorsulón por kg de peso corporal).

Indicaciones de uso:

Asociación de una lactona macrocíclica y un derivado de las sulfonamidas indicado para el tratamiento de parasitosis gastrointestinales y pulmonares por nematodos y en el tratamiento de *Fasciola* principalmente en fase adulta. Entre los que destacan; Endoparásitos: *Bunostomum phlebotomum*, *Cooperia pectinata*, *C. punctata*, *C. oncophora*, *C. surnabada*, *Dictyocaulus viviparus*, *Haemonchus placei*, *Mecistocirrus digitatus*, *N. spathiger*, *Nematodirus helvetianus*, *Oesophagostomum radiatum*, *Ostertagia lyrata*, *O. ostertagi*, *Strongyloides papillosus*, *Trichostrongylus colubriformis*, *T. axei*, *Thelazia spp.*, *Toxocara vitulorum*, Ectoparásitos: *Psoroptes ovis* var. *bovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*, *Chorioptes bovis*, *Hypoderma bovis*, *H. lineatum*, *Dermatobia hominis*, *Haematopinus eurytarnus*, *Linognathus vituli*, *Solenopotes capillatus*, *F. hepatica*, *F. gigantica*, *F. magna*.

Especies:

Bovinos (productores de carne).

Mecanismo de acción:

Grupo farmacológico: Lactona macrocíclica (Antiparasitario).

Ivermectina: La ivermectina estimula la descarga, del ácido gamma aminobutírico (GASA) en las terminaciones nerviosas de los endoparásitos (nemátodos), y aumenta la fijación del GASA en los receptores especiales de las uniones nerviosas, siendo así interrumpidos los impulsos nerviosos, con lo cual paraliza y mata los parásitos.

Clorsulón: Inhibe a la enzima 3-fosfoglicerato-cinasa y fosfogliceromutasa, las cuales participan en procesos metabólicos para la obtención de energía.

Tiempo de retiro:

No administre este producto 28 días previos al sacrificio de los animales destinados al consumo humano.



Contraindicaciones y restricciones:

No consumir derivados animales durante los 28 días posteriores al último tratamiento.

No administre como concomitante con drogas que actúan sobre los receptores GABA.

El medicamento está contraindicado en el embarazo.

No administre simultáneamente con barbitúricos y benzodiacepinas.

Se pueden presentar los siguientes signos de toxicidad y efectos adversos; Ataxia, comportamiento anormal, temblores, marcha en círculo, midriasis, letargo, debilidad, coma, incoordinación motora, hiperestesia, hiperkinesia, midriasis, protrusión del tercer párpado, desordenes del apetito, dificultad para alimentarse, reacciones cutáneas en el sitio de inyección SC.

El tratamiento contra efectos adversos y toxicidad va desde suspender el tratamiento y tratar los signos con carbón activado, fisostigmina, imidacloprid, picrotoxina o glicopirrolato dependiendo la severidad.

Utilizar equipo de protección personal adecuado al administrar este tratamiento.

Almacenamiento:

Conservar este producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.

Mantener este producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Nunca debe estar en contacto con estanques, ríos o lagos, ya que la ivermectina es altamente tóxica a los peces y crustáceos.

Debido a la toxicidad que representa la Ivermectina a los organismos acuáticos, los envases y sus residuos deberán desecharse en forma segura incinerándolos y/o enterrándolos.

Presentaciones: 100 y 500 ml.



CONSULTE AL MÉDICO
VETERINARIO