

COLLIVER LA

No. DE REGISTRO: Q-7701-037

Solución inyectable

Fórmula:

Cada 100 ml contienen:

Ivermectina.....10 g

Vehículo c.b.p.....100 mL

Indicaciones de uso:

Ivermectina para el tratamiento de endoparásitos gastrointestinales, renales y pulmonares por nemátodos, así como ectoparásitos como ácaros, piojos y larvas de mosca. Espectro: endoparásitos: pulmonares; *Dictyocaulus viviparus*, *Metastrongylus* spp., Gastrointestinales; *Ascaris suum*, *Bunostomum phlebotomum*, *Cooperia* spp., *Haemonchus placei*, *Hyostrongylus rubidus*, *Mecistocirrus digitatus*, *Nematodirus helvetianus*, *Oesophagostomum* spp., *Strongyloides* spp., *Trichuris suis*, *Trichostrongylus* spp., *Toxocara vitulorum*. Oculares: *Thelazia* spp. Renales: *Stephanurus dentatus*. Ectoparásitos; Larvas de mosca: *Oestrus* sp. Ácaros productores de sarna: *Psoroptes ovis* var. *Bovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *Ovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *Suis*, *Chorioptes bovis*. Piojos; *Haematopinus eurysternus*, *Haematopinus suis*, *Linognathus vituli*, *Solenopotes capillatus*.

COLLIVER LA
Solución inyectable



Dosis y vías de administración:

subcutánea.

Bovinos y ovinos: 1 mL/50 kg de peso corporal (equivalente a 200 µg de ivermectina por kg de peso corporal) una ocasión.

Porcinos: 1 mL/33 kg de peso corporal (equivalente a 300 µg de ivermectina por kg de peso corporal).

Especies:

Porcinos (lechones, engorda y reproductoras), bovinos (productores de carne y productores de leche) y ovinos (productores de carne).

Mecanismo de acción:

Grupo farmacológico: Lactona macrocíclica (Antiparasitario).

La ivermectina estimula la descarga, del ácido gamma aminobutírico (GABA) en las terminaciones nerviosas de los endoparásitos (nemátodos), y aumenta la fijación del GABA en los receptores especiales de las uniones nerviosas, siendo así interrumpidos los impulsos nerviosos, con lo cual paraliza y mata los parásitos.

Tiempo de retiro:

No administrar este producto 28 días previos al sacrificio de los animales destinados para consumo humano.



Contraindicaciones y restricciones:

No consumir derivados animales durante los 28 días posteriores al último tratamiento.

No administre como concomitante con drogas que actúan sobre los receptores GABA.

El medicamento está contraindicado en el embarazo.

No administre simultáneamente con barbitúricos y benzodiacepinas.

Se pueden presentar los siguientes signos de toxicidad y efectos adversos; Ataxia, comportamiento anormal, temblores, marcha en círculo, midriasis, letargo, debilidad, coma, incoordinación motora, hiperestesia, hiperkinesia, midriasis, protrusión del tercer párpado, desordenes del apetito, dificultad para alimentarse, reacciones cutáneas en el sitio de inyección SC.

El tratamiento contra efectos adversos y toxicidad va desde suspender el tratamiento y tratar los signos con carbón activado, fisostigmina, imidacloprid, picrotoxina o glicopirrolato dependiendo la severidad.

Utilizar equipo de protección personal adecuado al administrar este tratamiento.

Almacenamiento:

Conservar este producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.

Mantener este producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Nunca debe estar en contacto con estanques, ríos o lagos, ya que la ivermectina es altamente tóxica a los peces y crustáceos.

Debido a la toxicidad que representa la ivermectina a los organismos acuáticos, los envases y sus residuos deben desecharse en forma segura, incinerándolos y/o enterrándolos.

Presentaciones: 100, 250 y 500 mL



**CONSULTE AL MÉDICO
VETERINARIO**