

DICOLLFEN-50

No. DE REGISTRO: Q-7701-104

Solución inyectable

Fórmula:

Cada 100 mL contienen:

Diclofenaco sódico.....5 g

Vehículo c.b.p.100 mL

Indicaciones de uso:

Es un antiinflamatorio no narcótico, no esteroidal, con potente actividad analgésica y antipirética, recomendado para todos los casos que cursen con inflamación, dolor y fiebre, como mastitis, lesiones musculoesqueléticas y cólico.

Dosis y vías de administración:

Intramuscular profunda, intravenosa o subcutánea.

General: 1 a 2.5 mg de diclofenaco/kg, equivalentes de 1 a 2.5 mL de DICOLLFEN-50/50 kg de peso vivo, cada 24 h, de 1 a 3 días continuos.

Especies:

Bovinos (productores de carne y productores de leche), porcinos (lechones, engorda y reproductoras) y equinos.

Mecanismo de acción:

El mecanismo de acción principal

DICOLLFEN-50
Solución inyectable



relacionado con la inhibición de la síntesis de prostaglandinas.

Tiempo de retiro:

No administre este producto 7 días previos al sacrificio de los animales destinados al consumo humano.

No consuma la leche de los animales tratados con este producto hasta 6 días posteriores al último tratamiento.

Contraindicaciones y restricciones:

No administre este producto a equinos destinados al consumo humano.

No se recomienda su uso durante la gestación.

La administración conjunta con otros antiinflamatorios aumenta el riesgo de aparición de reacciones adversas por lo que se recomienda no administrar simultáneamente con glucocorticoides, otros antiinflamatorios no esteroideos, ni con anticoagulantes. Aminoglucósidos y otras sustancias con alto grado de unión a proteínas plasmáticas pueden competir por unirse a éstas y provocar efectos tóxicos. Debe evitarse la administración simultánea de sustancias activas potencialmente nefrotóxicas.

Es compatible con otros productos como la halofuginona y el etopabato.



Almacenamiento:

Conservar este producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
Mantener este producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Presentaciones: 20, 100 y 250 mL.



CONSULTE AL MÉDICO
VETERINARIO